



## HOP ODER TOP - Welche Früchte werden verschont?

	Frühe Sorten, die meist von Kirschessigfliegen verschont bleiben	Besonders gefährdete, späte Sorten
<b>Apfel, Birne</b>	alle Sorten	Kernobst wird nicht befallen, außer wenn die Früchte verletzt sind
<b>Erdbeeren</b>	frühe bis mittelfrühe Sorten, zum Beispiel 'Clery'	'Malwina', und die späten Früchte bei mehrmals tragenden Erdbeeren
<b>Süßkirschen</b>	'Kassins', 'Erika', 'Burlat', 'Maibigarreau', 'Napoleon', 'Schuhbacks frühe Schwarze'	'Regina', 'Kordia', 'Schneiders Späte Knorpelkirsche', 'Van'
<b>Sauerkirschen</b>	nur sehr frühe Sorten wie 'Favorit', 'Meteor', 'Achat'	alle mittelfrühen und späten Sorten
<b>Sommerhimbeere</b>	'Meeker', 'Elida', 'Remette', 'Valentina'	'Tulameen', 'Glen Ample', 'Schönemann'
<b>Herbsthimbeere</b>	nur die frühen Früchte von Ruten, die vorm Winter nicht abgeschnitten wurden	alle
<b>Brombeere</b>	'Loch Tay', 'Asterina' (aber nur bis Ende Juli/Anfang August)	alle, besonders sehr späte Sorten wie 'Reuben'
<b>Johannisbeeren</b>	'Jonkheer v. Tets', 'Versailler', 'Rohan', 'Rotet', 'Bona', 'Kieroyal', 'Omata'	Jostabeere, 'Titania', 'Heinemanns Rote Spätlese'
<b>Stachelbeeren</b>	alle Sorten, wenn sie bis Mitte Juli abgeerntet sind	überreife Beeren
<b>Kulturheidelbeeren</b>	nur die ersten Beeren von 'Duke', 'Reka', 'Patriot', 'Spartan'	'Elisabeth', 'Brigitta', 'Elliot'
<b>Holunder</b>	ganz früh gepflückte Dolden von 'Sampo', 'Samil', 'Samdal'	Wildholunder, 'Haschberg', 'Mammut', 'Black Lace'
<b>Weintrauben</b>	gelbe Trauben sind weniger befallen, 'Venus', 'Vanessa'	alle blauen und roten Sorten
<b>Pflaumen</b>	'Juna', 'Herman', 'Katinka'	Hauszwetsche, 'Jojo', 'Elena', 'Presenta', 'Haroma', 'Cacaks'



### Was kann man vorbeugend tun?

- \* Viel Platz zwischen den Pflanzen lassen und regelmäßig ausschneiden.
- \* Obst nicht überreif werden lassen, sondern frühzeitig ernten. Stachelbeeren zur Verarbeitung soll man ja sowieso halbreif pflücken.
- \* Auf keinen Fall verletzte oder faulige Früchte hängen lassen.
- \* Befallene Früchte in luftdicht verschließbare Plastiksäcke stecken und eine Woche lang in die Sonne stellen, dass die Fliegen eingehen. Man kann die Früchte auch mit kochendem Wasser übergießen. Dann in die Biotonne.
- \* Netze mit 0,8 mm Maschenweite 3-4 Wochen vor der Reife lückenlos über Sträucher oder Bäume ziehen. Das Netz nur zum Ernten öffnen. Mittags ernten, dann sind die Fliegen nicht so wanderfreudig wie morgens und abends. Unterm Netz Fallen aufhängen und hoffen, dass die eingeflogenen Tiere den Alkoholduft attraktiver finden, als den der frischen Früchte.

